



HIV検査や性感染症検査に関する情報は…

HIV検査・相談マップ

あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班

HIV検査や性感染症検査に関する情報は…

HIV検査・相談マップ

あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班

HIV検査や性感染症検査に関する情報は…

HIV検査・相談マップ

あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班

HIV検査や性感染症検査に関する情報は…

HIV検査・相談マップ

あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班

HIV検査や性感染症検査に関する情報は…

HIV検査・相談マップ

あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班

HIVまめ知識

ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆

HIVまめ知識

ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆

HIVまめ知識

ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆

HIVまめ知識

ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆

HIVまめ知識

ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆