



HIV検査や性感染症検査に関する情報は…  
**HIV検査・相談マップ**  
 あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>  
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班



HIV検査や性感染症検査に関する情報は…  
**HIV検査・相談マップ**  
 あなたにあわせて条件検索

<http://www.hivkensa.com/>  
<http://www.hivkensa.com/i/>

厚生労働省HIV検査法・検査体制研究班




山折り

**HIVまめ知識**

**ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？**

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆




山折り

**HIVまめ知識**

**ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド)・感染性ウィンドウ期とは何ですか？**

HIVの感染初期には、血液検査で感染の分からない期間があります。これを「ウィンドウ期 (ウィンドウペリオド・空白期間)」と呼んでおり、HIV抗体検査では感染した日からおよそ2ヶ月あります。また、ウィンドウ期の中でも血中にウイルスが存在し、輸血により感染が起きる危険性のある期間を特に「感染性ウィンドウ期」と呼んでいます。この期間に献血された血液は、輸血した患者さんにHIV感染の危険性があります。HIV感染のリスクのある場合は献血を避けて、保健所等の検査機関でHIV検査を受けてください。

◆ HIV感染とウイルスマーカー ◆



山折り

谷折り

**HIVまめ知識**

**HIV検査で陰性ならもう安心??? コンドームは嫌いなんだけど…**

**2ヶ月前までの結果です**  
 HIVに感染しても、体内でHIVが増え、抗体ができるまでには、通常4～8週間かかります。HIV検査が陰性であっても、検査前の2ヶ月間にHIV感染の危険性があると、心配が残ります。その場合は念のため、2ヶ月以上経ってから、もう一度検査を受けてください。

**今後のことはあなた次第…**  
 今までHIVに感染していなかったとしても、「これから大丈夫」と言えるかどうかは、あなたの行動次第です！今までは運が良かっただけなのかもしれません。「今後も大丈夫」かどうかは、今後、あなたがコンドームを有効に使えるかどうかにかかっています。

◆検査は早期発見・早期治療に役立ちます◆  
 HIV検査に関する詳しい検査情報等は…  
<http://www.hivkensa.com>

谷折り

**HIVまめ知識**

**HIV検査で陰性ならもう安心??? コンドームは嫌いなんだけど…**

**2ヶ月前までの結果です**  
 HIVに感染しても、体内でHIVが増え、抗体ができるまでには、通常4～8週間かかります。HIV検査が陰性であっても、検査前の2ヶ月間にHIV感染の危険性があると、心配が残ります。その場合は念のため、2ヶ月以上経ってから、もう一度検査を受けてください。

**今後のことはあなた次第…**  
 今までHIVに感染していなかったとしても、「これから大丈夫」と言えるかどうかは、あなたの行動次第です！今までは運が良かっただけなのかもしれません。「今後も大丈夫」かどうかは、今後、あなたがコンドームを有効に使えるかどうかにかかっています。

◆検査は早期発見・早期治療に役立ちます◆  
 HIV検査に関する詳しい検査情報等は…  
<http://www.hivkensa.com>

谷折り

山折り

**HIVまめ知識**

**性感染症にかかっていると、HIVに感染しやすいって本当？**

本当です！淋病、梅毒、クラミジアなどの性感染症 (STD) に感染していると、粘膜に炎症を起こしやすくなり、HIVにも感染しやすくなります。「エッチで病気をもらってもエイズじゃなきゃ大丈夫…」なんて油断してはいられません。淋病やクラミジアは症状の出ないことも多く、特に女性の場合、気がつかないで放っておくと、不妊症や子宮外妊娠の原因となることもあります。

HIV検査や性感染症検査に関する詳しい情報は…  
<http://www.hivkensa.com>

性感染症の中には性器だけでなく、口やのど、肛門へ感染するものもあります。性感染症の予防のためには、挿入時だけでなく、フェラチオやクンニリングスといったオーラルセックスの時にもコンドームを使うことが大切です (クンニリングスでは、コンドームをハサミで縦向きに切り広げて、膜として使います)。

山折り

**HIVまめ知識**

**性感染症にかかっていると、HIVに感染しやすいって本当？**

本当です！淋病、梅毒、クラミジアなどの性感染症 (STD) に感染していると、粘膜に炎症を起こしやすくなり、HIVにも感染しやすくなります。「エッチで病気をもらってもエイズじゃなきゃ大丈夫…」なんて油断してはいられません。淋病やクラミジアは症状の出ないことも多く、特に女性の場合、気がつかないで放っておくと、不妊症や子宮外妊娠の原因となることもあります。

HIV検査や性感染症検査に関する詳しい情報は…  
<http://www.hivkensa.com>

性感染症の中には性器だけでなく、口やのど、肛門へ感染するものもあります。性感染症の予防のためには、挿入時だけでなく、フェラチオやクンニリングスといったオーラルセックスの時にもコンドームを使うことが大切です (クンニリングスでは、コンドームをハサミで縦向きに切り広げて、膜として使います)。

山折り

谷折り

**HIVまめ知識**

**知っていますか？万が一の時の「緊急避妊」と「性感染症検査」**

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった！」「コンドームが使えなかった…」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

**緊急避妊**  
 緊急避妊としての「緊急避妊」を知っていますか？2時間以内に必要量の女性ホルモン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使うことで妊娠を防ぐ効果があります。  
 詳しい情報/病院の紹介は…  
 (社) 日本家族計画協会  
<http://www.jpfa-clinic.org>  
 ビルダイヤル 03-3267-7776  
 (月～金 10時～16時)  
 (匿名・無料です)

**性感染症検査**  
 「コンドームをつけなかった、破けてしまった」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可能性があります。症状が分かりにくい病気もあり、知らずに放っておくとパートナーや赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因になることもあります。  
 性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は…  
<http://www.hivkensa.com>

谷折り

**HIVまめ知識**

**知っていますか？万が一の時の「緊急避妊」と「性感染症検査」**

男女間のセックスで「コンドームが破けてしまった・取れてしまった！」「コンドームが使えなかった…」という場合には、妊娠の可能性とともに、性感染症の可能性もあります。

**緊急避妊**  
 緊急避妊としての「緊急避妊」を知っていますか？2時間以内に必要量の女性ホルモン剤を服用する方法や子宮内避妊具を使うことで妊娠を防ぐ効果があります。  
 詳しい情報/病院の紹介は…  
 (社) 日本家族計画協会  
<http://www.jpfa-clinic.org>  
 ビルダイヤル 03-3267-7776  
 (月～金 10時～16時)  
 (匿名・無料です)

**性感染症検査**  
 「コンドームをつけなかった、破けてしまった」時のセックス、オーラルセックスでは、性器や口・のどに性感染症がうつる可能性があります。症状が分かりにくい病気もあり、知らずに放っておくとパートナーや赤ちゃんに感染したり、また不妊の原因になることもあります。  
 性感染症やHIV検査に関する詳しい情報は…  
<http://www.hivkensa.com>

谷折り